

ANT02

”Glutenanalys”

Intolerans mot glutendelen i vete, råg, havre och korn, orsakar GSE som betyder ”gluten sensitivity enteropathy” eller celiaki. Celiaki karakteriseras av en kronisk inflammation av tarmens slemhinna och en förtvining av tarmluddet. Denna analys har tagits fram för att mäta nivåer av specifika IgA och IgG-antikroppar. Den innefattar också kartläggning av ”tissue transglutaminase antibodies” (tTGA). Dessa antikroppar (antibodies) har visat sig vara pålitliga vid upptäckt av celiaki. De är dessutom målantikroppar vid denna sjukdom. Glutenintolerans kan orsaka akuta och kroniska symtom, inkluderande anemi, oförklarad viktninskning, diarré, uppsvälldhet, gasbildning, orkeslöshet, allmänt illamående, hudceliaki (dermatitis herpetiformis), psykisk obalans, ont i leder och muskler.

Testkod: ANT02 **Testmetod:** EIA **Testsubstrat:** helblod, 1 x 10 ml EDTA provrör

Provtagningsföreskrifter: Inga.

Kartlagda antikroppar: Gliadin IgA, gliadin IgG och tTGA-antikroppar

EIA betyder Enzyme Immuno Assay. Det är en biokemisk analysmetod som används vid antikroppsanalyser.